En établissement de santé

Surveillance de la consommation des antibiotiques ATB-Raisin 2017

Bretagne

Famille d'antibiotiques	CHU/CLCC/HIA (N=4)	CH ≤ 33% lits CS (N=13)	CH > 33% lits CS (N=23)	MCO (N=21)	ESSR (N=20)	PSY (N=17)	Ensemble (N=98)
Pénicillines	285,6	74,1	246,9	163,5	72,5	44,5	182,7
Amoxicilline	114,8	27,4	84,3	53,7	30,3	20,1	66,6
Amoxicilline-ac. clavulanique	120,9	43,1	145,5	96,2	37,3	23,5	98,4
Pipéracilline tazobactam	14,5	0,3	5,9	5,5	1,1	0,0	5,6
Pénicillines M	30,3	1,7	7,2	6,4	2,0	0,3	9,1
Témocilline	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Céphalosporines (et aztréonam)	60,7	12,8	45,6	72,8	10,5	1,7	39,0
C1G et C2G	8,0	0,9	7,3	49,3	1,2	0,1	10,5
Céfoxitine	0,0	0,0	0,2	2,4	0,0	0,0	0,4
C3G	52,2	11,9	38,2	23,4	8,7	1,6	28,3
C3G orales	1,7	2,7	2,4	1,9	2,1	0,6	1,9
Céfotaxime	11,5	0,1	5,2	3,3	0,5	0,0	4,4
Ceftriaxone	21,0	8,6	25,9	15,7	3,0	1,0	16,4
C3G Inj. actives sur *P. aeruginosa*	18,1	0,4	4,7	2,5	3,1	0,0	5,6
Ceftazidime	3,8	0,3	2,5	1,5	2,6	0,0	2,1
Céfépime	14,1	0,1	2,2	1,0	0,2	0,0	3,4
Carbapénèmes	11,0	1,2	3,2	3,4	4,1	0,0	4,0
Quinolones	27,7	17,1	32,2	34,7	21,3	3,4	25,1
MLS	15,0	9,3	18,6	11,6	6,9	5,9	13,4
Antibiotiques autres*	35,2	2,8	20,9	21,4	8,3	0,7	17,8
Glycopeptides	14,0	0,8	4,7	7,1	1,3	0,0	5,3
Fosfomycine Injectable	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Daptomycine	3,7	0,1	1,2	0,5	1,3	0,0	1,3
Colistine	0,9	0,0	0,3	0,3	2,5	0,0	0,5
Linézolide	2,3	0,2	1,1	0,5	1,2	0,0	1,0
Tédizolide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anti-SRM**	20,0	1,1	6,9	8,0	3,8	0,0	7,5
Imidazolés	16,7	3,4	17,6	12,6	2,3	1,2	11,8
Sulfamides	16,3	4,8	8,0	4,5	10,5	1,1	8,0
Aminosides	7,9	0,4	4,8	12,6	3,2	0,0	5,1
Rifampicine	8,0	2,6	4,8	3,5	9,7	0,1	4,8
Cyclines	3,7	2,0	3,0	2,2	3,4	2,4	2,9
J01	464,3	126,9	384,8	327,9	143,5	60,6	299,5
Fidaxomicine	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Tous les ATB	**476,0**	**131,9**	**394,5**	**334,3**	**155,2**	**61,9**	**307,8**

* Antibiotiques classés en J01X

** Anti-SRM (anti staphylocoques résistants à la méticilline) : glycopeptides, linézolide, daptomycine, tédizolide.