Levée des Précautions Complémentaires en MCO

La levée des précautions complémentaires se fait sur prescription médicale

Précautions	Pathologies	Période d'incubation	Levées des précautions
Contact	Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe)		Procédures spécifiques Appel EOHH obligatoire
	Bactéries Multi Résistantes (BMR)		Procédures spécifiques
	Infection à *Clostridioïdes difficile*	5 à 10 jours	48h après les dernières diarrhées
	Gale	2 à 6 semaines Contagiosité : 24 h avant l'apparition des lésions	48h à 72h après l'instauration d'un traitement efficace des personnes et de leur environnement
	Gastro-entérite aigüe virale (GEA)	24 à 72h	48h après les dernières diarrhées
	Hépatite A Si diarrhée	En moyenne 28 jours (entre 15 à 50 jours) infectiosité : 15 jours avant et 8 jours après la disparition des symptômes	10 jours après le début de l'ictère
	Hépatite E Si diarrhée	En moyenne 40 jours (entre 20 à 75 jours)	Dés disparition des diarrhées
	Zona localisé		À assèchement des vésicules
Respiratoires	Adenovirus,	6 à 9 jours	À la guérison clinique
	Coqueluche	7 à 21 jours Maladie très contagieuse	3 à 5 jours selon l'antibiotique
	Infection respiratoire aigüe (IRA)	6 à 9 jours	Selon évolution clinique
	Méningites bactériennes	Variable, entre 2 à 10 jours	24h après le début d'un traitement efficace
	Oreillons	14 à 21 jours Contagiosité : 2 jours avant les signes cliniques et pendant la phase symptomatique (5 jours)	9ème jour après le début de la parotidite
	Rubéole	14 à 21 jours Contagiosité maximale : 5 jours avant l'éruption et jusqu'à 6 jours après	2 semaines après le début de l'éruption
	Scarlatine	1 à 3 jours	24h après le début du traitement
	Angine à strepto A	1 à 3 jours	Au 3 jours après le début d'un traitement antibiotique
	Virus respiratoire Syncytial (VRS)	2 à 8 jours	Jusqu'à guérison clinique

Avec la participation de Maëva MARCHIX – IBODE 2021

Levée des Précautions Complémentaires en MCO

La levée des précautions complémentaires se fait sur prescription médicale

Précautions	Pathologies	Période d'incubation	Levées des précautions
Respiratoires	Rougeole	10 à 14 jours	5 jours après début de l'éruption Déclaration obligatoire
	Tuberculose respiratoire	Pouvant aller de quelques mois à plusieurs années après une infection tuberculeuse latente (ITL)	15 jours voire + après début du traitement, selon avis médical
Contact + Respiratoires	Varicelle	14 jours Contagiosité : 2 à 4 jours avant l'apparition des 1ères vésicules et jusqu'à une semaine après, lorsque les premières vésicules sont sèches	Jusqu'à ce que toutes les lésions soient aux stades des croûtes
	Zona généralisé chez les immunodéprimés	Réactivation Contagiosité : 2 à 4 jours avant l'apparition des 1ères vésicules et jusqu'à une semaine après, lorsque les premières vésicules sont sèches	Jusqu'à disparition des lésions
Contact + Respiratoires	Coronavirus, SRAS, Covid-19	2 à 11 jours	Jusqu'à 10 jours après guérison
	Grippe	1 à 3 jours	Au 8ème jour

Avec la participation de Maëva MARCHIX – IBODE 2021