CPias Bretagne
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins



La Gale



Généralités

- Sarcopte *Scabiei hominis*
- Creuse des sillons dans la couche cornée de la peau
- Durée du cycle parasitaire: 10 à 20 jours
- Temps d'incubation de la primo-infection : 3 semaines en moyenne et jusqu'à 6 semaines
- Réinfection : environ 3 jours
- S'observe dans toutes les populations quels que soient l'âge ou le milieu socio-économique

Mode de transmission

- **Interhumain, par contact**
  - Direct : contact cutané, étroit et prolongé (ex: Soins de nursing)
  - Indirect : environnement, à partir du linge, de la literie

⇒ Pas de risque de contamination par les surfaces lisses : vaisselle, couverts, tables, stylo, téléphone…

Signalement

- Signalement en interne du ou des cas à l'équipe de prévention du risque infectieux
- Signalement externe via le portail **e-sin** ou **le portail de signalement,** en cas de transmission nosocomiale ou si survenue d'une épidémie

Différentes formes de Gale

- **Gale commune**
  - Prurit à recrudescence nocturne très important
  - Lésions localisées en particulier au niveau des plis: sillons, grattage, papulo-croûteux, eczématique
  - Contagieuse
  - Caractère collectif, familial ou conjugal très évocateur du diagnostic
- **Gale hyperkératosique**
  - Prurit sur tout le corps +/- présent
  - Lésions croûteuse, hyperkératosiques
  - Très contagieuse de par une forte prolifération parasitaire
- **Gale profuse**
  - Prurit sur tout le corps +/- présent
  - Lésions disséminées sur l'ensemble du corps: papillons, croûteuses avec sillons et nodules
  - Très contagieuse

⇒ **Gale chez le sujet âgé** : forme atypique avec atteinte plus fréquente du dos. L'apparition d'un cas chez les professionnels révèle parfois une épidémie chez les résidents

Diagnostic

- Observation des sillons par dermatoscope
- Complété par un examen de parasitologie pour confirmation du diagnostic : prélèvement par grattage d'un sillon à la curette

Avec la participation de Jessica JOLIVEL - EIBODE 2021

Prise en charge du résident

- **Précautions complémentaires CONTACT GALE associées aux Précautions standard**
  - Chambre seule nécessaire
  - Signalétique de porte
  - Hygiène des mains
    - A l'entrée → Friction Hydro-alcoolique (FHA)
  - A la sortie → Eau + Savon suivi une fois les mains sèches d'une FHA
  - Port d'Equipement de Protection Individuelle (EPI) avant d'entrer dans la chambre et à retirer avant la sortie de la chambre
    - Surblouse + Tablier imperméable à usage unique (UU) si soins mouillants ou souillants
    - Gants à UU
  - Marche en avant
  - Limiter le stockage de matériel dans la chambre
  - Préférer le matériel de soins individualisé ou à UU
  - Gestion des déplacements
    - Jusqu'à 48h suivant la prise du traitement: Arrêt des activités collectives, prise des repas dans la chambre, limitation des déplacements et suspension des transferts si possible
    - Si sortie de la chambre nécessaire: Hygiène des mains du résident par lavage, vêtements propres, informer la structure ou le service d'accueil

Recommandations aux visiteurs

- **Limiter les visites pendant les 48h suivant le traitement** et éviter tout contact direct avec le résident
- **Discuter du traitement du 1er cercle**
- **Hygiène des mains**
  - A l'entrée → FHA
  - A la sortie → Eau + Savon suivi d'une FHA
- Port d'une surblouse à UU à retirer avant toute sortie de la chambre et avant la réalisation d'un lavage des mains.
  - Elimination de la surblouse dans la chambre
- Ne pas s'asseoir sur le lit du résident
- Appliquer les consignes relatives à la prise en charge du linge et objets, données par l'équipe de soin

Gestion de l'environnement

L'utilisation de produit acaricide nécessite le port d'un masque chirurgical et l'aération de la chambre

- **Bionettoyage de l'environnement avec un détergent/Désinfectant habituel**
- Désinfection des dispositifs médicaux réutilisables partagés
- **Pour le matériel en tissu ou perméable** (brassard de tension, sangle…) **appliquer un anti-parasitaire :** déposer le matériel dans un sac plastique identifié et attendre le temps de contact indiqué par le fabricant
- **Gestion de la vaisselle** en lave vaisselle à 60°C avec celle des autres résidents
- **Gestion du linge sale**
  - Conditionner le linge en emballage hermétique, pas de stockage dans la chambre
  - Changer le linge de lit au quotidien pendant la durée du traitement
  - Traiter le linge dans les 12h après la prise médicamenteuse et vérifier l'intégrité des housses. Si housse dégradée, élimination en DASND après traitement par acaricide puis traitement de la literie par ce même procédé avant mise en place d'une nouvelle housse. Respecter un délai de 12h avant la réutilisation du matériel traité
  - **Lavable à une T°≥ 60°C** : Évacuer le linge rapidement selon le protocole d'établissement
  - **Lavable à une T° ≤ 60°C** : Déposer le linge dans un sac puis pulvériser le produit, fermer le sac hermétiquement et attendre le temps de contact préconisé par le fabricant , évacuer le linge par le circuit habituel
  - En l'absence de produit acaricide : Déposer le linge dans un sac hermétique pendant 3 jours pour une gale commune ou 8 jours pour une gale profuse puis laver le linge
  - Traiter les objets en tissus non lavables : coussins, peluches, assises de chaises
  - Mise en quarantaine du linge prise en charge par les familles : 72h minimum dans un sac hermétique et identifié
- **Gestion des déchets**

  Éliminer les déchets en DASND en veillant à ce que le sac soit bien fermé avant la sortie de la chambre