Levée des Précautions Complémentaires en Ehpad

La levée des précautions complémentaires se fait sur prescription médicale

Type de Précautions	Pathologies infectieuses	Période d'incubation	Levée des mesures possibles
Contact	**Gastro entérite aiguë GEA**	24 à 72 h	• 48h après les dernières diarrhées • En cas d'épidémie, 48h après la fin de signes cliniques du dernier cas • Signalement des cas groupés
Contact ET **Respiratoires** *si résident immunodéprimé*	**Zona généralisé**	10 à 21 j	À la disparition des lésions
Contact ICD	***Clostridoïdes difficile***	5 à 10 j	48h après les dernières diarrhées
Contact G	**Gale**	2 à 6 semaines 8 j en cas de récidive	48h après le début du traitement des personnes atteintes et de leur environnement
Respiratoires	**Grippe**	1 à 3 j	8 j après le début des signes cliniques
	Infection respiratoire aigüe non documentée IRA	6 à 9 j	• Disparition des signes cliniques • En cas d'épidémie, 8 j après la fin de signes cliniques du dernier cas
	Covid-19	3 à 5 j	• 10ème j après le début des symptômes ou de la date de la 1ère PCR positive • ET 48h après la disparition de la fièvre • ET besoin en $O_2 \leq 2l$ pour une saturation à 95%
	Tuberculose pulmonaire ou suspicion	6 semaines minimum	15 j après le début d'un traitement efficace

BMR et BHRe

- Pas de mise en *Précautions Complémentaires Contact* MAIS respect strict des *Précautions standard*
- Vigilance concernant l'hygiène des mains, la protection de la tenue, la gestion des *excreta,* la désinfection des dispositifs médicaux partagés et le bionettoyage
- Privilégier une chambre seule avec sanitaires privatifs
- Information à transmettre à tous les professionnels de santé prenant en charge le résident et lors d'éventuelles hospitalisation en secteur sanitaire
- Concernant les BHRe, prévenir l'équipe ou le professionnel en charge de la gestion du risque infectieux (EOH, IDE mutualisé-e….)

Avec la participation de Maëva MARCHIX – IBODE 2021