1. Pour l'entretien de la chambre d'un résident présentant une gastro-entérite aiguë, j'applique :

1. Le protocole de nettoyage quotidien habituel
2. Le protocole de bionettoyage avec un produit virucide à spectre total
3. Inutile de nettoyer, il risque de tout salir à nouveau

2. Qu'est-ce qu'une GEA ? :

1. Une Gestion d'Epidémie Aigüe
2. Une Gastro-Entérite Aigüe
3. Une Gestion de l'Eau et Air

3. Ce matin, Mme X, âgée de 85 ans, présente brutalement deux épisodes de diarrhée. Elle a vomi. Deux autres résidents se plaignent de nausées. Comment réagissez-vous ?

1. Il s'agit sans doute d'une indigestion et vous vous dites que cela ira mieux
2. Vous demandez à ces résidents de rester dans leur chambre
3. Je préviens l'IDE et / ou le médecin et l'ide hygiéniste

4. **Lors d'une GEA :**

1. Je mets des gants dès le contact avec le résident
2. Je porte un masque systématiquement
3. Je privilégie le lavage des mains plutôt que la friction hydro-alcoolique

5. Lors d'une épidémie d'une GEA ,il faut :

1. Renforcer l'hygiène des mains
2. Laver les bassins à la douchette
3. Recenser les cas et signaler à l'infirmière ou au médecin
4. Renforcer le bionettoyage des locaux avec le détergent-désinfectant habituel

6. En cas d'épidémie de GEA virale, j'entretiens l'environnement avec :

1. Le détergent-désinfectant habituel
2. Le protocole eau de javel
3. Un produit détergent-désinfectant sporicide
4. Un produit détergent-désinfectant virucide sur norovirus et rotavirus

7. Les précautions complémentaires :

1. Viennent en complément des précautions « standard »
2. Remplacent les précautions « standard »
3. S'appliquent sur prescription médicale ou selon le protocole

8. Qu'est-ce qu'une BHRe :

1. Une Bactérie Hormono-Résistante émergente
2. Une Bactérie Hautement Résistante émergente
3. Une Bactérie à Haut Risque d'émission

PRECAUTION COMPLEMENTAIRE rouge

9. Qu'est-ce qu'une IRA :

1. Une Insuffisance Respiratoire Auto-immune
2. Une Infection Respiratoire Aiguë
3. Une Infection Résistante aux Antibiotiques

10. Que signifie BMR ?

1. Bactérie Mondialement Reconnue
2. Bactérie Multi Résistante aux antibiotiques
3. Bactérie Moyennement Résistante aux antibiotiques
4. Une Bactérie Multi-Résistante aux Solution Hydro-Alcoolique

11. Quelles précautions complémentaires n'existent pas :

1. Précautions Complémentaire Eau (PCE)
2. Précautions Complémentaire respiratoire (PCR)
3. Précautions complémentaires surfaces (PCS)

12. Lors d'une épidémie en EHPAD, il est recommandé d'annuler toutes les animations collectives :

1. Vrai
2. Faux

13. Devant un résident présentant la gale, il faut :

1. Mettre en place des Précautions Complémentaires de type Contact (PCC)
2. Porter systématiquement une charlotte pour rentrer dans sa chambre
3. Après le contact avec le résident faire un lavage des mains au savon et un séchage avant de se frictionner les mains
4. Mettre tous les déchets de sa chambre en filière DASRI

14. Lors de gale, après le contact avec le résident :

1. Je me lave les mains au savon
2. Je lave les mains au savon, je les sèche, puis je me les frictionne avec une solution hydro-alcoolique
3. Je me frictionne les mains avec une solution hydro-alcoolique

15. Devant un résident suspect d'être porteur de la gale, je mets :

1. Tablier et gants
2. Je fais comme d'habitude
3. Une surblouse à manches longues et des gants
4. Je mets une charlotte, des sur-chaussures, une surblouse manches longues, des lunettes, un masque et des gants.

16. Une infirmière et une aide-soignante aident un résident dépendant porteur de gale à se vêtir, elles portent des gants. A la fin du soin, après avoir jeté les gants, elles réalisent une friction hydro-alcoolique :

1. Adapté
2. Non adapté

17. Lors d'épisode de diarrhées à *Clostridioides difficile,* après le contact avec le résident :

1. Je me lave les mains au savon
2. Je me lave les mains au savon, je les sèche, puis je me les frictionne avec une solution hydro-alcoolique
3. Je me frictionne les mains avec une solution hydro-alcoolique

18. Si infection à *Clostridioides difficile,* lors de l'entretien des locaux avec de l'eau de Javel, il faut :

1. Réaliser une détersion, un rinçage et séchage au préalable
2. Utiliser l'eau de Javel non diluée
3. Appliquer une dilution précise au 1/5
4. Respecter un temps de contact de 10 min

19. Pourquoi les infections à *Clostridioides difficile* nécessitent-elles des mesures particulières ?

1. Les produits détergents-désinfectants habituels sont inefficaces
2. La bactérie survit dans l'environnement sous forme de spore
3. Les produits hydro-alcooliques de désinfection des mains sont inefficaces
4. Parce qu'il porte bien son nom

20. Devant un résident présentant une IRA, je mets un masque :

1. Chirurgical et à l'entrée de la chambre
2. Chirurgical si la chambre est bien ventilée et avant d'entrer dans la chambre
3. FFP2 si la chambre est mal ventilée et avant d'entrer dans la chambre
4. Uniquement si contact proche avec le résident

21. Je suis enrhumé(e) et je porte un masque chirurgical. Lorsque je l'enlève, je le jette :

1. Dans les déchets d'activité de soins (DAS)
2. Dans les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
3. Aucune des deux, je le mets dans ma poche pour le remettre si besoin

22. Pour prendre en charge un résident grippé avec symptômes respiratoire, quel type de masque, dois-je porter ?

1. Masque chirurgical
2. Appareil de protection respiratoire *(type FFP2)*
3. Aucun, je suis vacciné contre la grippe
4. Aucun, j'ai déjà eu la grippe l'année dernière, je suis immunisé(e)

23. Comment entretenez-vous la vaisselle d'un résident en précautions complémentaires respiratoire ?

1. En lave-vaisselle
2. Je trempe dans un bain d'eau de Javel dans l'évier de l'appartement du résident
3. J'utilise de la vaisselle jetable

24. Lorsqu'un résident souffre d'une Infection Respiratoire Aiguë, quel est l'intérêt de faire un test grippe (TROD) :

1. De mettre un masque lors des soins à ce résident
2. De maintenir le résident dans sa chambre
3. De faire porter une charlotte à ce résident pour qu'il soit repérable de loin
4. De prévenir le risque d'épidémie

25. Quelles sont les règles à respecter pour optimiser l'efficacité d'un masque chirurgical ?

1. Le laisser sous le menton entre deux utilisations
2. L'ajuster au plus près du visage, barrette pincée
3. Laisser sortir le nez
4. Mettre un deuxième masque dans sa poche afin d'éviter de ressortir de la chambre

26. Le linge sale d'un résident grippé doit :

1. Obligatoirement être recueilli dans un sac hydrosoluble
2. Stocké dans sa chambre et évacué une fois par 24 heures
3. Suivre le circuit habituel d'évacuation du linge sale

27. Pour faire le diagnostic de la grippe, J'utilise un TROD avec

1. Des gants, un masque
2. Des gants et un tablier plastique
3. Des gants, un masque, un tablier plastique
4. Des gants, un masque, des lunettes

28. Pour prévenir les épidémies de grippe, Les professionnels doivent :

1. Porter un masque s'ils présentent des symptômes respiratoires
2. Prendre un traitement homéopathique contre la grippe
3. Éviter les transports en commun
4. Se vacciner chaque année
5. Être jeune et en bonne santé

29. En période hivernale, un résident présente un début de toux, et une fièvre à 39°. Que faut-il faire ?

1. Informer l'IDE et le médecin
2. Réaliser un Test Rapide à Orientation Diagnostique (TROD) de grippe sur prescription ou selon le protocole
3. Mettre un masque lors de la prise en charge du résident
4. Lui préparer un lait chaud avec du miel

30. Lors d'une suspicion de tuberculose pulmonaire chez un résident, il faut :

1. Faire porter un appareil de protection respiratoire type FFP2 au résident s'il circule hors de sa chambre
2. Faire porter un masque chirurgical au résident dans sa chambre si soins/visite
3. Porter un appareil de protection respiratoire type FFP2 avant de rentrer dans la chambre
4. Maintenir le résident en chambre seule, porte fermée

31. Quel type de précautions mettez-vous en place en EMS chez un résident porteur d'une BMR urinaire ?

1. Précautions standard
2. Précautions complémentaires respiratoires
3. Précautions complémentaires contact

32. Pour prendre en charge un résident porteur d'une BHRe :

1. Je respecte les précautions standard
2. Je le maintiens en chambre
3. Je privilégie une chambre seule
4. Je l'autorise à participer aux activités communes

33. Dans le service, j'entretien la chambre du résident selon le protocole « eau de Javel » uniquement si infection à:

1. Gastro-entérite aigüe
2. Clostridioïdes *difficile*
3. Gale
4. BHRe

34. Quand peut-on lever les Précautions Complémentaires auprès d'un résident présentant une Gastro-Entérite Aigüe ?

1. Dès la fin des symptômes
2. 48 h - 72H après la fin des symptômes
3. 96h après la fin des symptômes

35. En période hivernale, je recense les résidents présentant des symptômes d'IRA ou de GEA sur une grille de surveillance ?

1. Une fois par équipe
2. Une fois par jour
3. Une fois par semaine

36. La solution hydro-alcoolique est efficace, si elle répond à la norme EN NF 14476 :

1. Sur le virus de la grippe
2. Sur les virus de la gastro-entérite aigüe
3. Sur les virus informatiques
4. Sur le sarcopte de la gale

37. Le virus de la grippe se transmet principalement par :

1. Les gouttelettes respiratoires
2. L'environnement
3. Les mains
4. Par mail

38. Le virus de la gastro-entérite aigüe se transmet par :

1. Les gouttelettes respiratoires
2. L'environnement
3. Les mains
4. Les excreta

39. Quel est l'intérêt de recenser quotidiennement, à minima, les résidents présentant des symptômes d'IRA ou GEA sur une grille de surveillance, pendant la période hivernale :

1. Faire des statistiques à la fin de l'hiver
2. Détecter au plus tôt le début d'une épidémie pour la juguler
3. Être réactif dans la mise en place des mesures de précautions

40. Après un épisode épidémique de GEA ou d'IRA, avec l'équipe:

1. Je recherche et je liste les dysfonctionnements éventuels au cours de l'épisode
2. Je recherche des solutions aux dysfonctionnements recensés
3. Je mets en place des actions pour prévenir ces dysfonctionnements lors d'un prochain épisode
4. Je me dis, ouf, c'est terminé